

sich im Juli in einem festen, gelben Gespinnste zwischen Blättern und entwickelt sich im April.

*Bombyx Villica*, der schwarze Bär. S. März.

*Bombyx Betulifolia*, Birkenblattspinner. Die stark 3 Zoll lange, braun behaarte Raupe lebt von den Blättern der Saakweide. Ihr Leib ist weiß; unten gelb, der Kopf und ein Seitenstreif blaugrau. Ueber die Mitte läuft eine Kette schwarzer und hochgelber Flecken. Man findet sie im Frühjahr und Sommer. Im Juni oder Juli ist sie ausgewachsen und verfertigt sich dann ein kleines weißgelbes und dichtes Gehäuse. Die Puppe ist ebenfalls klein und zum Theil weißlich bestäubt. Der Schmetterling erscheint nach 3 Wochen.

*Bombyx Hebe*, die Wittwe, Garbenspinner, Hebe, weißbandirte Bärenmotte, weiße Bienenmotte, englischer Bär. Raupe schwarz, mit gleichfarbigen Warzen, oben mit schwarzen, an den Seiten mit rostgelben Haaren. Auf Schafgarbe, wildem Reifuß, Wolfsmilch, Hundszunge; verpuppt sich in diesem Monate auf der Erde in einem leichten Gespinnste und entwickelt sich Mitte Juni.

*Bombyx Dominula*, das Frauchen. S. März.

*Bombyx Humuli*, der Hopfenvogel. S. März.

*Bombyx Aesculi*, das Blausieb. S. März.

*Bombyx Quercifolia*, die Kupferglucke. S. März.

*Bombyx Plantaginis*, der Wegerichspinner. S. März.

*Bombyx Hera*, die spanische Fahne. S. März.

*Bombyx Cossus ligniperda*, der Weidenbohrer. S. März.

*Bombyx Russula*, der Rothfleck, Apostelmkrautspinner. Raupe schwarzbraun, mit fuchsrothen Haaren und