

*Noctua Glyphica.* S. Juni. Verpuppt sich in diesem oder dem folgenden Monate in einem Gespinnste.

*Noctua Alni.* S. Juli.

*Noctua Pinastris*, Föhreneule, Flügeleule. Raupe kastanienbraun mit dunkleren Punkten, einer weißlichen braungerandeten Rücken- und Seitenlinie und schrägen Seitenstrichen. Auf Sauerampfer; verpuppt sich in diesem oder dem folgenden Monate in einem Gespinnste und entwickelt sich im Mai oder Juni.

*Noctua Lucipara*, Brombeereule. Raupe grün, mit dunklen Schiefstrichen, der letzte Ring mit einem Höcker und weißen Punkte. Auf Brombeeren, Ampfer, Chamille, Steinklee, Rattenkopf, Dachsenzunge und Schöllkraut. Verwandlung im September in der Erde in einem Gespinnste und entwickelt sich im Juni.

*Noctua Umbratica.* S. Juli.

*Noctua Abrotani*, Stabwurzleule. Raupe grün, mit braunrothen Dornspitzen und zwei gleichfarbigen Halsflecken. Auf Stabwurz, Beifuß, Wermuth, Dragun, Chamille. Verwandlung in diesem oder dem folgenden Monate in der Erde in einem festen mit Wurzeln verwebten Gespinnste und entwickelt sich im Juli.

*Noctua Absinthii*, Wermuthleule. Raupe gelbgrün, mit weißer Rücken- und Seitenlinie, letztere rothbraun eingefast. An Wermuth und dem gemeinen Beifuß. Verwandlung in diesem Monate in einem Gewebe in der Erde und entwickelt sich im Juni oder Juli.

*Noctua Orion.* S. Mai. Verpuppt sich in diesem oder dem folgenden Monate zwischen Blättern.