

Brut kriecht in diesem Monate aus dem Ei, überwintert und verpuppt sich im Mai.

*Bombyx Villica*, der schwarze Bär. S. März.

*Bombyx Cossus Ligniperda*, der Weidenbohrer. S. März.

*Bombyx Cossus Terebra*, der Äspenbohrer. S. März.

*Bombyx Palpina*. S. Juni.

*Bombyx Testudo*, Erdschneckenspinner, Zwergeichenspinner, Schildmotte, Schneckenmotte. Die nicht über 1½ Zoll lange, schilbförmige Raupe findet man vom Juli bis September auf Eichen und Buchen. Im Oktober macht sie ein dichtes braunes Gewebe, welches im Innern weiß austapeziert und oft auch noch mit einem leichten eirunden weißen Gespinnste überzogen ist. Sie bleibt in dieser Wohnung den Winter über liegen und verwandelt sich erst im Frühjahr in eine braungelbe Puppe, welche im Juni ausflüpft.

*Bombyx Fascellina*. S. Mai.

*Bombyx Velitaris*. S. Juni. Verpuppt sich in diesem Monate in der Erde.

*Bombyx Fagi*. S. August.

*Bombyx Menthastri*, Rosmünzenspinner. Raupe dunkelbraun, mit schwarzen Haaren, gelber Rückenlinie und blauen Warzen. Lebt auf Brennnesseln, Münze, Krausemünze, Klöbkraut und andern niedrigen Gewächsen; verpuppt sich in diesem Monate in einem Gespinnste und entwickelt sich im Mai oder Juni.

*Bombyx Pudibunda*. S. August.

*Bombyx Milhauseri*. S. Juli.

*Bombyx Crenata*. S. August.